



Piccole molecole organiche di scarsa solubilità in acqua

Grassi, oli, cere, alcuni ormoni, alcune vitamine




Grasso animale—un triestere
(R, R', R'' = catene C₁₁-C₁₉)



Colesterolo


Divisi in due gruppi: con legami esterei idrolizzabili e non

Cere: acido carbossilico (C₁₆-C₃₆) + alcol (C₂₄-C₃₆)




Triacontile esadecanoato (contenuto nella cera d'api)



Grassi, oli: triacilgliceroli o trigliceridi



Stearico (18:0) e palmitico (16:0) i più diffusi acidi grassi saturi




Acido stearico




Acido linolenico, un acido grasso poliinsaturo (PUFA, dall'inglese PolyUnsaturated Fatty Acid)


Oleico (18:1) e linolenico (18:3) i più diffusi acidi grassi insaturi

Saponi



Una particella di sapone che solubilizza una particella di unto in acqua. La mappa di potenziale elettrostatico del carbossilato di un acido grasso mostra che la carica negativa si trova nel gruppo di testa (la funzione carbossilato).







Un detergente sintetico
(**R = una miscela di catene idrocarburiche alifatiche C₁₂**)

Detergenti alchilbenzensolfonici: non hanno lo svantaggio di formare sali inorganici insolubili con gli ioni alcalino-terrosi presenti nell'acqua dura


Fosfolipidi: diesteri dell'acido fosforico



Glicerofosfolipidi: glicerolo + acido grasso (satturo) + acido grasso (insatturo) + acido fosforico



Fosfatidilcolina, una lecitina





Fosfatidiletanolamina, una cefalina

dove R è saturo ed R' è insatturo.


Lipidi: fosfolipidi

Glicerofosfolipidi sono presenti in tessuti vegetali e animali costituendo il componente lipidico più diffuso delle membrane cellulari (40%)


Aggregazione dei glicerofosfolipidi nel **doppio strato lipidico** di cui sono composte le membrane cellulari.



Sfingomieline: fosfolipidi basati sulla sfingosina o molecole simili



Sfingosina




Una sfingomielina


Si trovano nel cervello e nel tessuto nervoso

C₂₀ contenenti un anello a 5 termini e due lunghe catene laterali

Inizialmente isolati dalla ghiandola prostatica della pecora, poi trovati in tutti i tessuti e fluidi



Prostaglandina E₁




Prostaglandina F_{2α}


Hanno svariati effetti biologici:

Abbassano la pressione sanguigna, influiscono sull'aggregazione delle piastrine, controllano l'infiammazione, controllano le secrezioni gastriche, ...

Altri composti legati alle prostaglandine hanno ulteriori effetti, tipo la risposta asmatica:




Sono biosintetizzati in natura a partire da un acido grasso insaturo: l'acido arachidonico (C₂₀)




La trasformazione con altri enzimi porta a una varietà di altre prostaglandine


Oli essenziali di origine vegetale: perlopiù miscele di terpeni (se idrocarburi) o terpenoidi



Carvone (olio di menta verde)






Alcol patchouli (olio di patchouli)



α -Pinene (tremontina)

I terpenoidi come derivati dall'unione testa-coda di unità isopreniche




Lipidi: terpenoidi


Monoterpeni: C_{10} , due unità isopreniche

Sesquiterpeni: C_{15} , tre unità

Diterpeni: C_{20} , quattro unità




Lanosterolo, un triterpene (C_{30})
Precursore degli ormoni steroidei




β -Carotene, un tetraterpene (C_{40})

Fonte di vitamina A

Basati su uno scheletro tetraciclico



Uno steroide
(R = varie catene laterali)




Gli anelli a 6 hanno conformazione a sedia ma non possono dar luogo ad inversione di anello a causa della rigidità del sistema


Nell'uomo fungono in genere da ormoni, messaggeri chimici secreti dalle ghiandole endocrine

Gli ormoni steroidei sono di tipo **sessuale** (controllano lo sviluppo e la crescita dei tessuti e la riproduzione) o **adrenocorticale** (regolano alcuni processi metabolici)


Ormoni sessuali maschili (o **androgeni**)



Testosterone



Androsterone




Androstendione


(Androgeni)

Sintetizzati dal colesterolo

Ormoni sessuali femminili (o **estrogeni**)




Estrone



Estradiolo

(Estrogeni)




**Progesterone
(un progestinico)**

Sintetizzati nelle ovaie dal testosterone


Hanno un anello aromatico

Ormoni adrenocorticali

Secreti dalle ghiandole surrenali, si dividono i mineralcorticoidi e glucocorticoidi



Aldosterone
(mineralcorticoide)




Idrocortisone
(glucocorticoide)

Regolano il bilancio tra Na^+ e K^+ nelle cellule


Coinvolti nel metabolismo del glucosio e processi infiammatori

Steroidi sintetici


contraccettivi orali e anabolizzanti




Ethinylestradiolo
(estrogeno sintetico)





Noretindrone
(progestinico sintetico)




Metandrostenolone
(Dianabol)



cis-Decalina




trans-Decalina




Conformazione degli steroidi. I tre anelli a 6 termini hanno conformazioni a sedia, ma non possono essere soggetti ad inversione d'anello. Gli anelli A e B possono essere uniti sia in posizione cis che trans.

Steroide A-B trans



Steroide A-B cis



Gli A-B trans sono più comuni, ma i cis si trovano nella bile epatica